

【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)。
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5) スティックパック開封後は、すみやかに服用してください。

第②類医薬品

トローチ

24粒

マオウエキス



キキョウ



マオウ



セネガ

せき・こえ・のど
アベシデリンE

第②類医薬品

和漢薬エキス(マオウ・キキョウ・セネガ)配合

せき・こえ・のど

発売元

アスゲン製薬株式会社

名古屋市東区泉二丁目28-8 製造番号

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10

使用期限

お問い合わせ先 アスゲン製薬(株)

☎ 052-931-1212

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 0120-149-931

販売名:アベシデリンE 第②類医薬品

服用に際しては、この説明文書を必ず読んでください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 高熱 (6) 次の診断を受けた人: 心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

鎮咳去痰薬

【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

【用法・用量】

次の1回量を1日3~4回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	大人(15歳以上)及び8歳以上	5歳以上8歳未満	5歳未満
1 回 量	1粒ずつ2粒まで	1粒	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス	340mg (原生薬換算量 2,040mg)	気管支をひろげ、せきを鎮めます。 また、のどの炎症をやわらげます。
キキョウ流エキス	400mg	気道粘液の分泌を促進し、たんを出しやすくします。
セネガ流エキス	200mg	

添加物: 黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、ℓ-メントール、香料
※本剤は和漢薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。