

せき・たんに〈糖衣錠〉
鎮咳去痰薬イススブロン錠[®]SS BRON[®] TABLETS

せきは、のどや気管支の病気にもなってあらわれる症状のひとつで、せきが長く続くと肺や心臓に負担がかかり、また睡眠が妨げられ、体力も消耗します。

エスエスブロン錠は、せきをしずめ、たんの排出をうながす効果のすぐれた白色の糖衣錠です。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)

👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。(4)高齢者。(5)本人又は家族がアレルギー体質の人。(6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7)次の症状のある人。
高熱、排尿困難 (8)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2)5～6回服用しても症状がよくなる場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

■ 効能・効果

せき、たん

■ 用法・用量

次の1回量を1日3回服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	成人(15才以上)	8才～14才	5才～7才	5才未満
1回量	4 錠	2 錠	1 錠	服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■ 成分と作用

エスエスブロン錠は、12錠（成人1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	12錠中	作 用
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	延髄にあるせきの中樞に作用し、せきの発生をおさえます。
dl-メチル エフェドリン塩酸塩	50mg	気管支筋の緊張をやわらげ、せきをしずめ、たんの排出をうながします。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	8mg	アレルギー性のせきをしずめます。
無水カフェイン	90mg	大脳皮質に作用し、ねむけを防ぎます。

添加物として、CMC-Ca、無水ケイ酸、セルロース、乳糖、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒプロメロース、炭酸Ca、カルナウバロウ、ステアリン酸Mg、タルク、酸化チタン、プルラン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコールを含有します。

■ せき・たんの治療には……………

本剤の服用のほか、次のようなことにも気をつけましょう。



睡眠、栄養を十分にとり体力の回復に努めましょう。



室内の空気の乾燥をさけましょう。



うがいなどをしてのどをいたわりましょう。

■ 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にビンのフタをよくしめて保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)本剤をぬれた手で扱わないでください。ぬれた手で扱うと、糖衣にムラができたり、変色したりすることがあります。(5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。(6)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

■ お問い合わせ先

お買い求めのお店、又はお客様相談室にお問い合わせください。

エスエス製薬株式会社 お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-028-193

受付時間：9時から17時30分まで（土、日、祝日を除く）

