

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬
第②類医薬品

コフハイドリンせきどめシロップ

「せき」「たん」は、呼吸器疾患でもっとも多く発生する症状で、不快感や体力の消耗をとまいません。「せき」においては、1回当たり約2カロリーのエネルギーを消耗します。そこで1分間に1回の割合で「せき」を続けるとすると、10時間では1,200カロリーものエネルギーを消耗することになります。又、「たん」は空気の通り道(気道)にこびりついて気道を狭くするため、息ぐるしさや、不快感をおこします。

コフハイドリンせきどめシロップは、鎮咳薬のジヒドロコデインリン酸塩、気管支拡張薬のdl-メチルエフェドリン塩酸塩、抗ヒスタミン薬のクロルフェニラミンマレイン酸塩に加え、鎮咳去痰作用のある生薬、キキョウ、セネガを配合しておりますので「せき」「たん」にすぐれた効果をあらわします。

⚠ 《使用上の注意》

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬。
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
(眠気があらわれることがあります。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい
便秘、口のかわき。

効能・効果

せき、たん。

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用して下さい。場合により1日6回まで服用して差し支えありませんが、原則として4時間の間隔をおいて服用して下さい。

年 齢	1 回 量	備 考
15才以上	5.0mL	添付の計量コップを用い、 年齢に応じて、左記の分 量を計って下さい。
11才以上15才未満	3.3mL	
8 才以上11才未満	2.5mL	
5 才以上 8 才未満	1.5mL	
3 才以上 5 才未満	1.2mL	
1 才以上 3 才未満	1.0mL	
3 ヶ月以上 1 才未満	0.5mL	
3 ヶ月未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。

成分・分量

成 分	1 日 量 (30mL) 中	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30.0mg	せき、くしゃみの緩和
dl-メチルエフエドリン塩酸塩	75.0mg	せき、くしゃみの緩和
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12.0mg	くしゃみ、鼻水の緩和
キキョウ流エキス(キキョウとして900mg)	0.9mL	せき、たんの緩和
セネガ流エキス(セネガとして900mg)	0.9mL	たんの緩和

添加物としてl-メントール、クエン酸、クエン酸Na、D-ソルビトール、安息香酸Na、香料、白糖を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 過量服用・長期連用しないで下さい。(倦怠感や虚脱感等があらわれることがあります。)
- (2) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (3) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (4) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) びん口、計量コップは常に清潔にして下さい。
- (6) 使用期限はケース底面及びラベルに記載されています。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く服用して下さい。
- (8) 本剤は生薬成分を含むため、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。

本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口

日新製薬株式会社

TEL (0748) - 62 - 4161

FAX (0748) - 62 - 3417

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62