

第3類医薬品

ウチダのしゃぜんそう T U 500g

日本薬局方シャゼンソウ 日本産 寸

用法・用量 大人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

効能・効果 せき

ロット：???2956 使用期限：???????

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



脱酸素剤封入

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)



製品情報
はこちら

<お問合せ先>
お客様相談センター
電話番号 03-3806-4141
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日を除く)

発売元

株式会社ウチダ和漢薬
新潟県上越市大潟区蜘蛛池1755-3

シャゼンソウ

製造販売元

鶴居薬品工業株式会社
富山県南砺市野尻457-1 NNJ