

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮咳去痰薬

せき、たん、のどに セキトローチ

咳は呼吸器の症状として、生理的に出てくる重要なものですが、これが連続的に出ると苦しいもので、又誰でもがよく経験するのどの炎症による声がれ・のどの不快感・のどの痛みなど、又たんのため人前で話しをするときなど、咳と共に大変困る場合がよくあります。

本剤は淡緑色、芳香のある甘いリング状のトローチ剤で、口中で徐々に溶かすことにより、咳を鎮め、たんをとりのどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感に優れた効果をあらわします。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

※ 2. 次の人は使用しないでください

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。
高熱

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい

※ まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる。

- (2) 5～6回使用しても症状がよくならない場合

裏面も必ずお読みください

【効能・効果】

せき、たん

のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感

【用法・用量】

次の1回量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

年 齢	1 回量	1 日使用回数	使用 間 隔
成 人（15 歳 以 上）	1 錠	6 回	2 時間以上
11 歳以上 15 歳未満			
8 歳以上 11 歳未満		4 回	4 時間以上
5 歳以上 8 歳未満		3 回	
5 歳 未 満 の 乳 幼 児	使用しないでください。		

＜用法・用量に関連する注意＞

1. 用法・用量を厳守してください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 本剤はトローチ剤ですので、かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。
4. 本剤は5歳未満の乳幼児には使用させないでください。
5. トローチ剤の取り出し方

右図のようにトローチ剤の入っているPTPシートの凸部を指先で（PTPシートの取り出し図）強く押して裏側のアルミ箔を破り、取り出してください。（誤ってそのままのみ込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



【成分と作用】

6錠（1錠：1.2 g）中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	作 用
セチルピリジニウム塩化物水和物	6 mg	殺菌作用をもち細菌の感染を予防します。
フェノールフタリン酸 デキストロメトルファン	60 mg	せき中枢を抑制してせきを止めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	140 mg	気道の分泌を促進して痰の粘度を薄め、 痰を切りやすくします。

添加物として、精製白糖、粉末還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、マクロゴール6000、ポビドン、銅クロロフィリンナトリウム、ステアリン酸カルシウム、バニリン、L-メントール、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 本剤は吸湿性をもっています。アルミ袋を開封し、日数を経ると湿気の多いときは、変色することがあります。ご使用の残りは、特に湿気に注意し、変色したものは、使用しないでください。
5. 使用期限（外箱に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

日新薬品工業株式会社 お客様相談室

〒520-3426 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

☎ 0120-415-688

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

日新薬品工業株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1