

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要なときに読めるよう本剤とともに保存してください。

第②類医薬品

せきにせきどめ顆粒N



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある)
3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)高齢者。
 - (4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (6)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - (7)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、口のかわき

【効能又は効果】

せき、たん

【用法及び用量】

次の量を水又は白湯にて服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1 包	3回服用する
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4包	
3 歳未満	服用しないでください	

【用法及び用量に関する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】


1日量（3包）中

成 分	分 量
日局 ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
〃 dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
〃 クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
〃 グアイフェネシン	300mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ケイ酸A 1、乳糖水和物、CMC-C a及びヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)1包を分割した残りを使用する場合は、保管に注意し2日以内に使用してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)

**【お問合せ先】**

寧薬化学工業株式会社

〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25

TEL：0745-22-4151

受付時間：9:00～16:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元 寧薬化学工業株式会社

奈良県大和高田市旭南町2-25