

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要などきに読めるよう本剤とともに保存してください。

第②類医薬品 **せきにせきどめ顆粒N** 鎮咳去痰薬

せきを沈める成分と痰のねばりを取り、排出を促す成分
を配合した服用しやすい顆粒状のせきどめ薬です。

使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある)
 3. 授乳中の人には本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
 4. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
偽アルドステロン症	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

症状の名称	症 状
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

せき、たん

【用法及び用量】

次の量を水又は白湯にて服用する。

年 齢	1回量	1日服用回数
15歳以上	1 包	3回服用する
11歳以上15歳未満	2/3包	
8 歳以上11歳未満	1/2包	
5 歳以上 8 歳未満	1/3包	
3 歳以上 5 歳未満	1/4包	
3 歳未満	服用しないでください	

【用法及び用量に関する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】


1 日量（3 包）中

成 分	分 量
日局 ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
〃 dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
〃 クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
〃 グアイフェネシン	300mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ケイ酸AⅠ、乳糖水和物、カルメロースCa及びヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)1 包を分割した残りを使用する場合は、保管に注意し2 日以内に使用してください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)



【お問合せ先】

寧薬化学工業株式会社
〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25
TEL：0745-22-4151
受付時間：9：00～16：00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **寧薬化学工業株式会社**
奈良県大和高田市旭南町2-25