

ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに

セピーせき止め顆粒

CEPIE COUGH GRANULE

鎮咳・去痰 生薬配合

〔特 徴〕

セピーせき止め顆粒は、せきを鎮める成分（リン酸ジヒドロコデイン、dl-塩酸メチルエフェドリン、d-マレイン酸クロルフェニラミン）、たんの切れをよくする成分（グアヤコールスルホン酸カリウム、塩化リゾチーム）にさらに4種類の生薬を配合した優れた鎮咳・去痰剤です。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
1. 次の人は服用しないでください
(1) 本剤又は鶏卵によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) フェニルケトン尿症の人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気があらわれることがあります。）

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。

- (2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
便秘、口のかわき

（必ず裏面もお読みください）

〔効能・効果〕

せき、たん

〔用法・用量〕

年 齢	1回量	用 法
成人（15才以上）	1包	1日3回、食後に服用してください。
11才以上15才未満	2/3包	
8才以上11才未満	1/2包	
5才以上 8才未満	1/3包	
3才以上 5才未満	1/4包	
3才未満	服用しないでください。	

〔用法や用量に関する注意〕

- （1）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （2）定められた用法、用量を厳守してください。

〔成 分〕 1日量（3包）中

成 分	分 量	はたらき
リン酸ジヒドロコデイン	30mg	せきの中枢にはたらい、せきを鎮めます。
dl-塩酸メチルエフェドリン	75mg	気管支をひろげて、せきを鎮めます。
d-マレイン酸クロルフェニラミン	6mg	アレルギーが原因となっておこるせきを鎮めます。
グアヤコールスルホン酸カリウム	270mg	たんを液化して、たんの切れをよくします。
塩化リゾチーム	60mg（力価）	たんの切れをよくします。
キキョウ乾燥エキス	40mg （原生薬換算量400mg）	気道分泌を促し、たんをうすめてたんの切れをよくします。
セネガ乾燥エキス	27mg （原生薬換算量405mg）	
キョウニンエキス	40mg （原生薬換算量400mg）	せきを鎮めるとともに清涼感をあたえます。
ケイヒ末	100mg	香りにより、のどの不快感をやわらげます。

添加物として、アスパルテム（L-フェニルアラニン化合物）、D-マンニトール、結晶セルロース、カルメロースカルシウム及び香料を含有する。

〔成分及び分量に関する注意〕

本剤の服用により、糖尿病の検査値に影響を及ぼすことがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- （5）外箱に表示の使用期限内に服用してください。また、使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室
TEL 03-3661-2080（ダイヤルイン）
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造発売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

