

タイフケシノール シロップ



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 過量服用・長期連用しないこと
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気があらわれることがある。)

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3)授乳中の人。
 - (4)高齢者。
 - (5)本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7)次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
 - (8)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - (1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
そ の 他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2)5～6回服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること
便秘、口のかわき

【効能又は効果】

せ き, た ん

【用法及び用量】

年齢区分	1 回量	服用回数	服 用 時 期
15才以上	5 ml	1 日 6 回	約 4 時間の間隔をおいて服用
11才以上15才未満	3 ml		
8 才以上11才未満	2 ml		
5 才以上 8 才未満	1.5ml		
5 才未満	服用しないこと		

◎用法及び用量に関連する注意

- (1)定められた用法及び用量を厳守すること。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (3)添付の目盛付コップを用いて用量を正しく量って服用すること。

【成分及び分量】

1日量 (30ml) 中

ジヒドロコデインリン酸塩 30mg dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg
無水カフェイン150mg クロルフェニラミンマレイン酸塩 10mg
カンゾウエキス (原生薬1.0g)300mg キキョウ流エキス 0.6ml
セネガ流エキス 0.6ml 車前草流エキス 1.4ml
添加物としてエタノール, 安息香酸ナトリウム, パラオキシ安息香酸ブチル, エチルパ
ニリン, バニリン, 香料, 白糖, D-ソルビトール液を含有する。

◎成分及び分量に関連する注意

本剤は、生薬のエキスを多く含むので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振り混ぜてから服用すること。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所 在 地 名古屋市中区栄1丁目29番6号

T E L 052 (202) 0067

受付日時 月～金曜日 AM10:00～PM3:00
(祝・祭日を除く)

製造販売元



大和製薬株式会社

富山県富山市水橋二杉1-2