

2013年11月記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに
チミコデシロップN
リゾチーム塩酸塩配合 鎮咳去痰薬

チミコデシロップNは…

せきを鎮めるジヒドロコデインリン酸塩、*dl*-メチルエフェドリン塩酸塩、南天実流エキス、クロルフェニラミンマレイン酸塩、からまるたんを出しやすくするリゾチーム塩酸塩、キキョウ流エキス配合の甘くてのみやすいシロップです。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気等があらわれることがあります。)
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
- 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 乳児。(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります。)
 - 高齢者。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
 - 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精 神 神 経 系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死融解症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
便秘、口のかわき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕
せき、たん



〔用法・用量〕

下記の1回服用量を毎食後及び必要に応じて就寝前に服用します。
また、場合により1日6回まで服用できますが、その場合には約4時間の間隔をおいて服用してください。

年齢	成人(15才以上)	11～14才	8～10才	5～7才	3～4才	1～2才	3～11カ月	3カ月未満
1回 服用量	 10mL	 6.5mL	 5mL	 3mL	 2.5mL	 2mL	 1mL	服用しないで ください
1日 服用回数	3回							

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。(添付の計量カップをご使用ください)
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 2才未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

〔成分・分量と働き〕 60mL中

成 分	分 量	働 き
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg	せきの中枢に働いて、せきを鎮めます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg	気管支をひろげ、せきを鎮めるとともに、たんを出しやすくし、呼吸を楽にします。
リゾチーム塩酸塩	60mg (力価)	粘稠なたんをうすめて、出しやすくします。
南天実流エキス	1.2mL (原生薬1.2gに相当)	せきを鎮める生薬です。
キキョウ流エキス	0.5mL (原生薬0.5gに相当)	からまるたんをうすめて、出しやすくする生薬です。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	12mg	抗ヒスタミン作用により、せきを鎮めます。
カフェイン水和物	90mg	中枢神経に作用して、他の成分の働きを助けます。

添加物として、D-ソルビトール液、L-グルタミン酸Na、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、安息香酸Na、パラベン、アルコール、プロピレングリコール、赤色2号、香料(バニリン、エチルバニリンを含む)を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

本剤は、生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがありますが、効果には変わりありません。よく振ってから服用してください。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 服用後は、必ずピンの口をよく拭いてから、キャップを十分にしめて元の箱に入れ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 計量カップは、使用のつどよく水洗いして、本剤とともに清潔に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

発売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

製造販売元
福地製薬株式会社
滋賀県蒲生郡日野町寺尻824 ©
ASX1