

第3類医薬品

のど トキワ南天喉飴（せき止め薬）

服用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

「トキワ南天のど飴」は、古くからせきやのどのあれなどに効果のある煎じ薬として用いられていた「南天」の実を有効成分としたドロップタイプのせき止め薬です。せき、のどのあれにすぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 高熱
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなりません

効能又は効果

せき、のどの炎症による
声がれ・のどのあれ・のどの不快感・
のどの痛み・のどのはれ

用法及び用量

食間に服用してください。下表の1回量を1錠ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法及び用量に関連する注意〉
(1) 用法及び用量を守ること。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分及び分量

1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス……500mg 添加物として、黒砂糖、白糖、水アメ、l-メントール、アラビアゴム、カaramel、サラシミツロウ、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手のとどかない所に保管すること。(3) 品質を保持するため、開封後はフタをしっかりとしめること。(4) 期限を過ぎた製品は服用しないこと。(使用期限は缶の側面に記載)

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室 ☎0120-875-710まで
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)
www.tokiwayakuhin.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
☎0120-149-931

製造販売元

常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP

常盤薬品はノエビアグループです。

CCF804
809AA