

※2012年10月改訂
(記載要領変更に伴う改訂)

第3類医薬品

のど トキワ南天喉飴（せき止め薬）

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
必要なときに読めるように、大切に保管してください。

「トキワ南天喉飴」は古くからせきやのどのあれなどに効果のある煎じ薬として
用いられていた「南天」の実を有効成分とした、黒糖シナモン風味のドロップ
タイプのせき止め薬です。つらいせき、のどの痛みにも効果をあらわします。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など（鼻炎用
内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬など）



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用
を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録
販売者に相談してください

効能・効果

せき、のどの炎症による声がれ・のどの
あれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

用法・用量

食間に服用してください。下表の1回量を1錠ずつ口の中に含み、かまず
にゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔を
おいて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1日量(9錠)中 南天実乾燥エキス……500mg 添加物：黒砂糖、白糖、水アメ、l-メントール、アラ
ビアゴム、カラメル、サラシミツロウ、タルク、カルナウバロウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない
所に保管してください。(3) 品質を保持するため、開封後はフタをしめてください。(4) 期限を過ぎ
た製品は服用しないでください。(使用期限は缶の側面に記載)

＜お問い合わせ先＞

本品に関してのお問い合わせは、お買い求め
先または下記までご連絡ください。

常盤薬品工業株式会社

お客さま相談室 ☎ 0120-875-710まで

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

南天のど飴のブランドサイトはこちら

<http://nodoame.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931

製造販売元

常盤薬品工業株式会社

大阪市中央区安土町3-5-12

NOEVIR GROUP

TISJ206