

医薬品

日本標準商品分類番号8751

トチモトの

カンゾウP (日本薬局方 カンゾウ)

Lot.No.

内容量 500g

◎本品はGlycyrrhiza uralensis Fischer 又は Glycyrrhiza glabra Linné(Leguminosae)の根及びストロンで、ときには周皮を除いたもの(皮取りカンゾウ)である。本品は定量するとき、換算した生薬の乾燥物に対し、グリチルリチン酸2.5%以上を含む。

確認試験：TLCによる確認

純度試験：(1) 重金属 10ppm以下

(2) ヒ素 5ppm以下


(3) 総BHC及び総DDT 各々0.2ppm以下

希エタノールエキス：25.0%以上

酸不溶性灰分：2.0%以下

乾燥減量：12.0%以下

灰分：7.0%以下



株式会社 本天海堂

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06 (6312) 8425

日本薬局方
カンゾウ

〔使用上の注意〕

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 高齢者。
 - (3) 次の症状のある人。 むくみ
 - (4) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談下さい。
 - (1) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 1カ月位服用しても症状がよくなる場合。
3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。

〔効能・効果〕

激しい咳、咽喉痛の緩解

〔用法・用量〕

大人（15歳以上）は1日量5gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服して下さい。

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わるため)
- (4) 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管して下さい。