

第2類医薬品

日本薬局方 カンゾウ トチモトのカンゾウP 甘草（西北・〇切） 500g



製造番号
使用期限

【使用上の注意】

してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。 (4) 次の症状のある人。 むくみ
(5) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文を持って医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法・用量】

大人（15歳以上）は1日量5gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服してください。
・定められた用法・用量を守り、正しくお使いください。

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 煎液は腐敗を防ぐために冷所に保管してください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

[脱酸素剤入]

株式会社 杉本天彦堂

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730

9005281