

第2類医薬品

《日本薬局方カンゾウ末》
トチモトの
カンゾウ末 P
(皮去) 内容量 500g

【使用上の注意】裏面をよくお読み下さい。

【成分及び分量又は本質】

1日量(1g)中 日本薬局方カンゾウ末1g

【効能又は効果】激しい咳、咽喉痛の緩解

【用法及び用量】大人(15歳以上)は1回量0.5g、

1日2回、食前または食間に服用して下さい。

(添付のさじ1杯約0.5g)

・定められた用法・用量を守り、正しくお使い下さい。



4 987466 111128

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

【使用上の注意】

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。 (4) 次の症状のある人。 むくみ
(5) 次の診断を受けた人。 高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある
ので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は
直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|---|
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛 があらわれ、徐々に強くなる。 |

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、
この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してくだ
さい

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に封をして
保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)

◎ 品質には細心の注意をはらっておりますが、お気づきの
点がございましたら、弊社までご連絡ください。

製造番号

[脱酸素剤入]

使用期限

株式会社 **橋本天海堂**

大阪市北区末広町3番21号 TEL 06(7711)0730