

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

せき・たんに
ドップェル錠D

ー トコン末・カンゾウ(甘草)エキス配合 せきどめ薬 ー

第2類医薬品

ドップェル錠Dは、たんを切る働きのある生薬トコン末と、せきを鎮める働きのあるジヒドロコデインリン酸塩、カンゾウ(甘草)エキスを配合したせきどめ薬です。空せきといわれる乾性のせきと、たんを伴う湿性のせきの両方に良く効きます。

【使用上の注意】



してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる。）

- 1. 過量服用・長期連用しないでください。**
- 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
- 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。**
（眠気があらわれることがある。）
- 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。**

相談すること



- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。**
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の症状のある人。
高熱、むくみ、排尿困難
(7)次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、腎臓病、緑内障、甲状腺機能障害
- 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。**
(1)服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

〔裏面につづく〕

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、 まぶたが重くなる、手がこわばる、 血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。

【効能・効果】

【用法・用量】

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15才以上	4錠	3回
8才以上 15才未満	2錠	
5才以上 8才未満	1 錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉


【成分】 (12錠中)

ジヒドロコデインリン酸塩	30 mg	カンゾウ(甘草)エキス	600 mg
<i>dl</i> -メチルエフェドリン塩酸塩	75 mg	(原生薬換算量 3g)	
<i>d</i> -クロルフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	トコン末	10 mg

添加物としてパレイショデンプン、カルメロースCa、ケイ酸Al、硬化油、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 品質保持のため、錠剤をとりだすときはキャップにとり、手にふれた錠剤はビンに戻さないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先

- 1) 購入した薬局・薬店
2) 全薬工業お客様相談室
住所：〒112-8650 東京都文京区大塚5-6-15
電話：03（3946）3610
受付時間：9:00～17:00（土・日・祝祭日を除く）



製造販売元

全藻工業株式会社

東京都豊島区東池袋3-22-14
営業所 東京都文京区大塚5-6-15
<http://www.zenvaku.co.jp>