



## 使用上の注意

### ❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 本人または家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱 (7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消化器   | 悪心・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい        |

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

### その他の注意

本剤は生薬エキスをを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。

## 【効能・効果】

せき、ぜんそく、たん、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのはれ

## 【用法・用量】

次の量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

| 年 齢             | 1 回 量    | 1日服用回数 |
|-----------------|----------|--------|
| 大人(15歳以上)及び8歳以上 | 1粒ずつ2粒まで | 3～4回   |
| 5歳以上8歳未満        | 1粒       |        |
| 5歳未満            | 服用しないこと  |        |

### ＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 用法・用量を厳守してください。

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】8粒(大人1日量)中

|          |                              |                                                         |
|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| マオウエキス   | 340mg<br>(原生薬換算量<br>2,040mg) | 気管支拡張作用、抗炎症作用があり、つらいせきや、ぜんそくのせきを鎮めます。また、荒れたのどの炎症を修復します。 |
| キキョウ流エキス | 400mg                        | 気道(のどの奥)粘液の分泌を盛んにしてたんのきをよくし、気道をなめらかにします。                |
| セネガ流エキス  | 200mg                        |                                                         |

添加物:黒砂糖、白糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、ℓ-メントール、香料

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) スティックパック開封後は、すみやかに服用してください。

### お問い合わせ先

株式会社 龍角散 お客様相談室  
 東京都千代田区東神田2-5-12  
 電 話:03-3866-1326  
 受付時間:10:00～17:00  
 (土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度  
 電話0120-149-931

発売元 株式会社 龍角散  
 東京都千代田区東神田2-5-12

製 造 高市製薬株式会社  
 販売元 奈良県高市郡明日香村野口10