

この箱はお薬とともに保管し、ご使用に際してよくお読みください。

### ▲ 使用上の注意

#### ☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起りやすくなります)  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

#### Ⓡ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱 (6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
3. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

本剤は生薬エキスを用いた製品ですから、製品により色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

#### 【効能・効果】

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をとまなうせき、たん、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ

#### 【用法・用量】

次の量を、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)及び8歳以上	1粒ずつ2粒まで	3～4回
5歳以上8歳未満	1粒	
5歳未満	服用しないこと	

#### ＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

#### 【成分・分量】8粒(大人1日量)中

マオウエキス (原生薬換算量 2,040mg)	340mg	気管支拡張作用、抗炎症作用があり、つらいせきを鎮めます。また、荒れたのどの炎症を修復します。
キキョウ流エキス	400mg	気道(のどの奥)粘液の分泌を減らし、気道をなめらかにします。
セネガ流エキス	200mg	

添加物:黒砂糖、白糖、水アセリン脂肪防酸化剤、メントール、香料

#### 【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) スティックタイプの開封後は袋の口を折り返して保管し、すみやかに服用してください。

発売元  **龍角散**

製造 **高市製薬株式会社**

東京都千代田区東神田2-5-12 販売所 **奈良県高市郡明日香村野口10**

別冊出典  
台 豊 京 産

(＜製法＞) 日 乾、日、干)  
00:00:01: 製 造 所  
1-1326 東 京 都 千 代 田 区 神 田 2-5-12  
室 薬 研 究 所 有 限 公 司 製 造 所

193-641-2101 豊 島 製 薬 有 限 公 司

おたのしみ留付

せきを鎮めるマオウエキス配合

のどあれ たん せき

鎮咳去痰薬

# 龍角散 ドロップス



【ノドカクサンEH】

第②類医薬品 24粒入り

### マオウ

気管支を拡張、咳を鎮めます。

### キキョウ

漢方では去痰、鎮咳、消炎などに使用されています。

### セネガ

鎮咳、去痰剤として利用されています。



龍角散  
ドロップス

第②類医薬品

24粒入り

せき たん のどあれ

【ノドカクサンEH】

