

使用に際してはこの箱をよく読んでください。

ノドロップコフ

第2類医薬品

【効能・効果】せき・たん・のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ。

【用法・用量】大人(15才以上)及び11才以上…1回2粒、1日5~6回。5才以上11才未満…1回1粒、1日5~6回。5才未満…使用しないでください。口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用してください。2時間以上の間隔をおいて使用してください。【用法・用量に関する注意】小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分・分量(12粒中)】フェノールフタリン酸デキストロメトルファン…60mg、グアヤコールスルホン酸カリウム…135mg、セチルピリジニウム塩化物水和物…6mg。添加物:白糖、水アメ、銅クロロフィリンNa、メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン

使用上の注意 ▲

【してはいけないこと】〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕1.次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。2.本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

【相談すること】1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。1)医師の治療を受けている人。2)妊娠又は妊娠していると思われる人。3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。4)次の症状のある人。高熱 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤・かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐・食欲不振	呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。




使用期限
登録販売者

副作用被書捺済制度
0120-149-931



せき
のど
ドロップ

開け口



せき・たん・のどあれ・痛み

ノドロップコフ

鎮咳去痰薬

〈スティック包装〉

第2類医薬品



高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10
TEL 0744-54-2514

24粒(4粒×6スティック)

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。

A8