

使用に際してはこの箱をよく読んでください。 **鎮咳去痰薬**

**⚠ 使用上の注意**

**☒ [してはいけないこと]**  
 (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
 1. 次の人は使用しないでください。  
     本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
 2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。  
     他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

**☒ [相談すること]**  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
     (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
     (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱  
 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6回使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。



**【効能・効果】**せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

**【成分・分量】**1日量 (12粒) 中

成 分	分 量
フェノールフタリン酸デキストロメトルファン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	135mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物：白糖、水アメ、銅クロロフィリンNa、I-メントール、ショ糖脂肪酸エステル、香料、エタノール、プロピレングリコール、バニリン

**【用法・用量】**次の量を口中に含み、かますにゆっくり溶かして使用してください。  
2時間以上の間隔をおいて使用してください。

年 齢	1回量	1日使用回数
大人 (15才以上) 及び11才以上	2粒	5~6回
5才以上11才未満	1粒	
5才未満	使用しないでください	

**【用法・用量に関する注意】**

小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

**【保管及び取扱い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)

A-8

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

**【お問い合わせ先】**  
 日新薬品工業株式会社 お客様相談室  
 ☎ 0120-415-688  
 受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

**発売元** 日新薬品工業株式会社  
 滋賀県甲賀市甲賀町田堵野80-1

**製 造** 高市製薬株式会社  
**販売元** 奈良県高市郡明日香村野口 10