

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。



せき・たん
ブロムヘキシン塩酸塩配合

パブロンS せき止め

第2類医薬品

〈せき止め薬〉

◆パブロンSせき止めは、つらいせきや、たんの症状を改善するソフトカプセルのせき止め薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

必ず読むこと!



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1 過量服用・長期連用しないでください*

2 次の人は服用しないでください

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

3 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬

4 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気があらわれることがあります)

5 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



相談すること



1 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (7) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害

2 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

便秘、口のかわき

効 能

せき・たん



用法・用量

次の量を食後なるべく30分以内に服用してください。

年齢	1 回量	服用回数
15才以上	2 カプセル 	1 日 3 回
8 ～ 14才	1 カプセル 	
8 才未満	服用しないこと 	

【注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) カプセルの取り出し方
図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

(カプセルの取り出し図)



成 分

2 カプセル中

成 分	分 量	はたらき
ブロムヘキシン塩酸塩	4mg	せきの原因となるたんを出しやすくします。
ジヒドロコデインリン酸塩	10mg	せき中枢にはたらき、せきをしずめます。
ノスカピン	20mg	せきをしずめ、呼吸を楽にします。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	25mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
マレイン酸カルピノキサミン	4mg	抗ヒスタミン作用により、せきをしずめます。
無水カフェイン	50mg	中枢に作用して他の成分のはたらきを助けます。

添加物：バレイショデンプン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ゼラチン、グリセリン、ポリソルベート80、パラベン、酸化チタン、黄色5号

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



せき、たんを早く治すため、次の点にもご注意ください



喫煙はさけましょう。



室内の空気の乾燥やホコリ等に気をつけましょう。



冷たい空気に当たらないようにしましょう。



栄養・睡眠を十分にとり、体力の消耗を防ぎましょう。

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)