

せき・たんに

第②類医薬品

ペリコデエース錠

〔鎮咳去痰薬〕

せきはのどや気管支などの分泌物や異物を排除する防衛機構ですが、あまり過度になると、かえって体力を消耗し、病気の回復が遅れたり、さらには余病を併発する場合があります。

ペリコデエース錠は鎮咳薬ジヒドロコデインリン酸塩、去たん薬セキサンエキス、さらに鎮咳・去たんの両作用を持つシャゼンソウエキスを配合したせき・たんの治療薬です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. **本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください**
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
2. **服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください**
(眠気等があらわれることがあります)
3. **授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください**
4. **過量服用・長期連用しないでください**



相談すること

1. **次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人。

心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症 *

2. **服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症 状 の 名 称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

(裏面につづく)

無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量

1日3回、食後なるべく30分以内に次の量を服用してください。

年齢	1回量	年齢	1回量
15才以上	4錠	8才～11才未満	2錠
11才～15才未満	2½錠	5才～8才未満	1錠

【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を必ず守ってください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 12才未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

* 成分と働き


4錠中に次の成分を含んでいます。

成分	含量	働き
ジヒドロコデインリン酸塩	10mg	せきの中枢に働いてせきの発生を抑えます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	18mg	気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきをしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	2.8mg	アレルギー性のせきをしずめます。
シャゼンソウエキス	72mg	せきをしずめ、たんをきる効果があります。
セキサンエキス	12mg	たんを排出させる効果があります。

添加物として乳糖、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Ca、セルロースを含んでいます。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

お問い合わせ先

本剤の服用により、何か変わった症状があらわれるなど、お気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

三宝製薬株式会社 お客様相談室 電話03-3952-0100
月～金曜日 9：00～17：00（祝祭日を除く）



製造販売元
三宝製薬株式会社
東京都新宿区下落合2-3-18

A1417K