

効能・効果

せき、たん、
ぜんそく、
のどの炎症に
よる声がれ・
のどのあれ・
のどの不快感・
のどの痛み・
のどのほれ

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際には、よくお読みください。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎
用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 授乳中の人。(4) 高齢者。(5) 本人または家族がアレルギー体質の人。(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(7) 次の症状がある人。高熱 (8) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合 (2) 5~6回服用しても症状がよくならない場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

成 分 成人1日量(12粒)中

dl-メチルエフェドリン塩酸塩37.5mg、グアヤコールスルホン酸カリウム135.0mg、セチルピリジニウム塩化物水和物6.0mg
添加物：銅クロロフィルNa、グリセリン脂肪酸エステル、還元パラチノース、L-メントール、香料

用法・用量

成人(15歳以上)および8歳以上は1回2粒、5歳以上8歳未満は1回1粒を1日5~6回、口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用する。2時間以上の間隔をおいて服用する。なお、5歳未満は服用しないこと。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) スティックパック開封後は速やかに服用すること。
- (5) 本剤の使用期限は外装に記載してあるので、使用期限内に服用すること。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

市販薬

医師監製



Nodora-Kun