

使用前にこの箱の説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

ペラックスイート ライムS 24粒

第2類
医薬品

使用上の注意

してはいけないこと

本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 授乳中の人 (4) 高齢者
(5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6) 次の症状のある人：高熱
(7) 次の診断を受けた人：心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があります
ので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は
登録販売者に相談して下さい。

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- 3～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この
外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

成分・分量 12粒中

DL-メチルエフェドリン塩酸塩 37.5mg
グアヤコールスルホン酸カリウム 135.0mg
セシルトリジニウム塩化水和物 6.0mg

添加物：銅クロロフィリン、グリセリン脂肪酸エステル、イソマル、I-メン
トール、香料

用法・用量

成人(15歳以上)	1回2粒	1日5～6回 口中に含み、かまずにゆっくり 溶かして服用して下さい。
及び 8歳以上		
5歳以上8歳未満	1回1粒	2時間以上の間隔をおいて服用して下さい。
5歳未満		服用しないで下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)5歳以上の
小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わります)
- スティックパック開封後は速やかに服用して下さい。
- 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

効能・効果

せき、たん、
ぜんそく、
のどの炎症に
よる声がれ・
のどのあれ・
のどの不快感・
のどの痛み・
のどのはれ

使用期限
登録販売
店

のどの痛み・せき
のどの炎症による声がれ
たんに効く

第2類医薬品

ペラックスイート®
ライムs



Nodora-Kun

24粒 甘さスツクリシユガーレス
カロリーと虫歯が気になる方に



Daiichi-Sankyo

第一三共ヘルスケア

副作用被害救済制度 電話 0120-149-931



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10
http://www.daiichisankyo-hc.co.jp/

製造販売元
高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香町野口10

●お問い合わせ先
第一三共ヘルスケア株式会社
電話 0120-337-336
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

お客様相談室

