

# 日本薬局方 シャゼンソウ

第3類医薬品

## 用法及び用量

大人（15歳以上）は1日量10gを、水約600mlをもって煮て約400mlに煮つめ、滓をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

## 効能又は効果 せき

## △使用上の注意

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

LOT 705606



4 993512 220232

500 g

製造販売元



株式会社 小島漢方

大阪市中央区常盤町2-2-19  
TEL 06-6941-1643

副作用被害救済制度 電話0120-149-931



株式会社 小島漢方  
大阪市中央区常盤町2-2-19  
TEL 06-6941-1643

## □保管及び取扱い上の注意

- 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。
- 本品は天産品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意下さい。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないで下さい。
- 本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため季節により脱酸素剤を入れる事があります。開封後は高温多湿を避け、なるべくお早めにご使用下さい。
- 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願い致します。