

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

鎮咳去痰薬

リコデ®せきトローチ

⚠《使用上の注意》

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
高熱
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- (2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

効能又は効果

のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感
せき、たん

用法及び用量


何れも口中に含み、かまずにゆっくり溶かして下さい。服用間隔は2時間以上おいて下さい。尚小児（5才～11才）の場合は4時間以上おいて下さい。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
15才以上	1錠	6回
11才以上 15才未満	1錠	6回
8才以上 11才未満	1錠	4回
5才以上 8才未満	1錠	3回
5才未満の乳幼児	服用しないで下さい	

（用法・用量に関連する注意）

- （1）用法・用量を厳守して下さい。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- （3）錠剤の取り出し方

右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）



成分及び分量

6錠（1日量）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
塩化セチルピリジニウム	6 mg
デキストロメトルファンフェノールフタリン塩	60 mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140 mg

添加物として白糖、還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、ポピドン、マクロゴール、ステアリン酸Ca、銅クロロフィリンNa、香料、バニリン、プロピレングリコール、デキストリン、アラビアゴムを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- （2）小児の手の届かない所に保管して下さい。
- （3）他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- （4）使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地