

効能又は効果

- ・のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感
- ・せき、たん

成分及び分量(6錠(1日量)中)

セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 60mg、
グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg

添加物：白糖、還元麦芽糖水アメ、セラチン、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Ca、
銅クロロフィリンNa、香料、バニリン、プロピレングリコール、デキストリン、アラビアゴム

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

せきの の トローチ



24錠

せき・たん・のどの痛みに

リコデ®せきトローチ

ZENEL

第2類医薬品

第2類医薬品

リコデ®トローチ

24錠

せき・たん・のどの痛みに

副作用救済制度 電話0120-149-931

24錠

リコデ®せき の トローチ

第2類医薬品

せき・たん・のどの痛みに



箱

内袋
成形シート

リココデ®せきトローチ

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(5) 次の症状のある人。高熱
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさがあらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合。

口
漏
薬製造番号
使用期限

用法及び用量

15才以上 1回1錠 1日6回、11才以上15才未満 1回1錠 1日6回、8才以上11才未満 1回1錠 1日4回、5才以上8才未満 1回1錠 1日3回 何れも口中に含み、かまずにゆっくり溶かすものとする。服用間隔は2時間以上おくこと。尚小児(5才～11才)の場合は4時間以上おくこと。*(1)用法・用量を厳守して下さい。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)5歳未満には服用させないで下さい。(4)錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



お問い合わせ先 受付時間：9時から17時まで
電話06-6352-2381 (土、日、祝日を除く)



発売元

ゼネル薬品工業株式会社

大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

ゼネル薬工粉河株式会社

和歌山県紀の川市粉河840番地

