

効能又は効果

・のどの炎症による声がれ・のどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感
・せき、たん

成分及び分量(6錠(1日量)中)

セチルピリジニウム塩化物水和物 6mg、デキストロメトルファンフェノールフタリン塩 60mg、
グアヤコールスルホン酸カリウム 140mg

添加物：白糖、還元麦芽糖水アメ、ゼラチン、ポビドン、マクロゴール、ステアリン酸Ca、
銅クロロフィリンNa、香料、バニリン、プロピレングリコール、デキストリン、アラビアゴム

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

せきの の トローチ



24錠

第2類医薬品

せき
トローチ

24錠

リコネ
トローチ

せき・たん・のどの痛みに

せき・たん・のどの痛みに

リコネ®せきトローチ

ZENEL

第2類医薬品

24錠

リコネ

せき

トローチ

第2類医薬品

せき・たん・のどの痛みに



製造番号
使用期限

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 次の人は服用しないで下さい。本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起したことがある人。
 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい(眠気等があらわれることがあります)。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状	関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	呼吸器	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

用法及び用量

15才以上 1回1錠 1日6回、11才以上15才未満 1回1錠 1日6回、8才以上11才未満 1回1錠 1日4回、5才以上8才未満 1回1錠 1日3回 何れも口中に含み、かまずにゆっくり溶かすものとする。服用間隔は2時間以上おくこと。尚小児(5才～11才)の場合は4時間以上おくこと。*(1)用法・用量を厳守して下さい。

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3)5歳未満には服用させないで下さい。(4)錠剤の取り出し方 右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用して下さい。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



お問い合わせ先 受付時間：9時から17時まで
電話06-6352-2381 (土、日、祝日を除く)



発売元

ゼネル薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

ゼネル薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

