

ZENEL 第②類医薬品

10mL×6

せき・たん

リコテシロップ®

シャゼンソウ流エキス
キキョウ流エキス配合携帯に
便利な10mL
ボトル

第②類医薬品

ZENEL 第②類医薬品

せき・たん

リコテシロップ®

シャゼンソウ流エキス
キキョウ流エキス配合

10mL×6

成分及び分量 (5mL中)

ジヒドロコデインリン酸塩 5mg、dℓ-メチル
エフェドリン塩酸塩 12.5mg、クロルフェニ
ラミンマレイン酸塩 2mg、グアヤコールスル
ホン酸カリウム 45mg、シャゼンソウ流エキ
ス 0.4mL、キキョウ流エキス 0.15mL
添加物：白糖、D-ソルビトール、エタノール、
安息香酸Na、パラベン、ケイヒ油

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

せき・たん

リコテシロップ®

シャゼンソウ流エキス
キキョウ流エキス配合

10mL×6

店舗専用

携帯に便利な
10mLボトル

第②類医薬品

せき・たん

リコポシロップ

シャゼンソウ流エキス
キキョウ流エキス配合

10mL×6

保管及び取り扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。



発売元 **ゼネル**薬品工業株式会社
大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元 **ゼネル**薬工粉河株式会社
和歌山県紀の川市粉河840番地

ZENEL

押してあける

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬 2. 過量服用・長期連用しないで下さい。 3. 服用後は乗物等の運転をしないで下さい(眠気があらわれることがあります)。 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 高齢者。(4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(6) 次の症状のある人。高熱、排尿困難 (7) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合。

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談して下さい。便秘、口のかわき

効能又は効果

せき、たん

用法及び用量

1回 15才以上 5mL、11才以上15才未満 3mL、
8才以上11才未満 2.5mL、5才以上8才未満 1.5mL、
3才以上5才未満 1.2mL、1才以上3才未満 1mL
1日4回。また場合によっては1日6回まで服用することとしても差し支えないが、1日5～6回まで服用する場合には、原則として、約4時間の間隔を置いて服用する。(計量容器を添付する)

* (1) 用法・用量を厳守して下さい。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(3) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させて下さい。(4) 1歳未満の乳児には服用させないで下さい。(5) 本剤は生薬成分を配合した内服液ですので、まれに沈殿を生じることがあります。よく振ってから服用して下さい。

製造番号

使用期限

副作用救済制度 電話0120-149-931