

第②類医薬品

丸太せきどめ顆粒

効能・効果

せき、たん

用法及び用量

15歳以上 1回1包

12歳以上15歳未満 1回 $\frac{2}{3}$ 包

1日3回、食後に服用する。

なお、12歳未満の小兒は服用しないこと。

成分及び分量 1日量(3包中)

ジビドロコデインリン酸塩 30mg

dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 9mg

グアイフェネシン 300mg

無水カフェイン 90mg

キキョウ末 300mg

添加物として、カンゾウ粗エキス、乳糖、パレイショデンブン、

ヒドロキシプロビルセルロースを含有する。

注意

1. 12歳未満の小兒は服用しないこと
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
4. 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
5. 服用に際しては、添付文書をよく読むこと
6. 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること

2包(1包1,000mg×2)入¥385(税込み)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

配置期限



せき・たんに



第②類医薬品

丸太せきどめ顆粒

ジビドロコデインリン酸塩
キキョウ末

配合

製造販売元 丸太中嶋製薬株式会社

奈良県御所市今住170
お問い合わせ先 0745-67-0006

この説明書は本剤とともに保管し服用に際しては必ずお読みください

第2類医薬品

鎮咳去痰薬（せきどめ）使用上の注意



☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 12歳未満の児童は服用しないこと
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること
5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに服用を中止し、この文書と製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状	関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤 かゆみ	精神神経系	めまい
消化器	吐き気・嘔吐 食欲不振	泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は增强が見られた場合には、服用を中止し、この文書と製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
便秘、口のかゆき、眠気
- 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書と製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法及び用量に関して

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用されること

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい場所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。

<お問い合わせ先>

製造販売元 丸太中嶋製薬株式会社
奈良県御所市今住 170 TEL 0745 (67) 0006