

2008年6月作成(新様式)

包装 15包入・45包入

ご使用に際しては、必ずこの説明書をお読みください。
また、いつでも読めるように大切に保管してください。

喘息痰咳 治療剤 三和生薬 ぜんそく 散

・三和生薬ぜんそく散は喘息の苦しい発作をしずめ、痰の切れをよくし、咳をおさえ、苦しい咳をやわらげます。

効能

喘息、気管支炎、
痰咳、祛痰

用法・用量

年 齢	一回に飲む量
成人(15歳以上)	1包
8歳以上15歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包

いずれも1日3回、食前又は食間に服用する。
小児に服用される場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分

一日量……………〔3包 8.4g〕中
 ・日局 カンゾウ末……………0.5g
 ・日局 ケイヒ末……………0.3g
 ・日局 シャクヤク末……………0.3g
 ・日局 アンナカ……………0.5g
 マオウエキス散……………6.8g
 添加物として沈降炭酸Caを含有する。

■保管および取扱い上の注意

- (1) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) この説明文書には、本剤を服用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで、外箱に入れたまま保管してください。
- (6) 防湿包装にしていますが、薬の性質上、固化することがありますが効力に変わりありませんので安心してご服用ください。なお、固化していると思われる場合外部よりもみほぐしますと粉末化します。

本剤は天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、粉末の色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

⚠使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) 高齢者。

(6) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消 化 器	悪心、食欲不振、胃部不快感
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

(2) 5～6回服用しても症状がよくならない場合

製造販売元



三和生薬株式会社

宇都宮市平出工業団地6-1

■お問い合わせ先：TEL 03-3834-2171(代)

