

第2類医薬品

包装 15包入・45包入

喘息痰咳 治療薬 三和生薬 ぜんそく散

・三和生薬ぜんそく散は喘息の苦しい発作をしずめ、痰の切れをよくし、咳をおさえ、苦しい咳をやわらげます。

△使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸の弱い人。
- (4) 発汗傾向の著しい人。
- (5) 高齢者。
- (6) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

(7) 次の症状のある人。

排尿困難

(8) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感
そ の 他	発汗過多、全身脱力感

3. 5～6回服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

喘息
気管支炎
祛痰
痰咳

用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 齢	1回量
成人(15歳以上)	1包
8歳以上15歳未満	1/2包
5歳以上8歳未満	1/3包
5歳未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

成分・分量

一日量……………(3包 8.4g)中

・日局 カンゾウ末……………0.5g

・日局 ケイヒ末……………0.3g

・日局 シャクヤク末……………0.3g

・日局 アンナカ……………0.5g

マオウエキス散…6.8g

添加物として沈降炭酸Caを含有する。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) この説明文書には、本剤を服用の際に必要な注意事項などが記載されていますので、服用が終わるまで、外箱に入れたまま保管して下さい。
- (6) 防湿包装にしていますが、薬の性質上、固化することがありますが効力に変わりありませんので安心してご服用下さい。なお、固化していると思われる場合外部よりもみほぐしますと粉末化します。

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、粉末の色が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

■お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室

東京都千代田区外神田6-6-1 TEL 03-3834-2171(代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

製造販売元



三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1