

登 錄 商 標



第②類医薬品

鎮咳去痰薬

新 セキドーム

・ 奈良株式会社赤玉堂権原 ・

第②類医薬品

新セキドメ

**効能・効果
用法・用量**

せき、たん

15才以上(成人)	1回	1包	11才以上15才未満	1回	2/3包
8才以上11才未満	1回	1/2包	5才以上8才未満	1回	1/3包
3才以上5才未満	1回	1/4包			何れも1日3回食後服用する。

- *(1)用法及び用量を厳守すること。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
(3)3才未満の乳幼児には、服用させないこと。

成分・分量 1日量3包(1包1.1g)中

ジヒドロコデインリン酸塩 30mg dL-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg

クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg グアイフェネシン 300mg

添加物としてケイヒ末、カンゾウ末、パレイショデンブン、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロースを含有する。

- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
- 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
- 服用が適さない場合があるので、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用に際しては、説明文書をよく読むこと
- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- 配置期限経過後は服用しないこと

奈良県橿原市曲川町2丁目7-13
製造販売元 株式会社 赤玉堂
TEL 0744-22-0269

2包(1.1g×2)入
¥250.



F

鎮咳去痰薬

第②類医薬品

△ 新セキド×使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと
3歳未満の乳幼児。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと
(眠気等があらわれることがある。)
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けること
5. 過量服用・長期連用しないこと



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (6) 次の診断を受けた人。
心臓病、高血圧、糖尿病、線内障、甲状腺機能障害

裏面もお読みください

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらつとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 便秘、口のかわき、眠気

4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

保管及び取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には袋の折り口を折り返して保管し2日以内に服用すること。
- (5) 配置期限経過後は服用しないこと。