

2005年9月改訂

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

龍角散

医薬品

鎮咳去痰薬

龍角散は、鎮咳去痰作用を活発にする生薬（キキョウ・セネガ・キョウニン・カンゾウ）を主成分としたノドの薬です。

人間の気管の内面には、線毛細胞が一面にあり、その線毛は1分間に約1,500回の速さで絶えず振動し、また気管の内壁からは粘液を分泌しています。気道を通して来たチリやホコリ、細菌などはこの粘液にとり込まれ、線毛の振動によって体外に排出されます。これが自然の浄化作用です。

ノドの使いすぎや喫煙、汚れた空気を吸ったりするとノドが炎症を起して痛んだり、タンがからんだりして浄化能力がおとろえ、セキで苦しむことになります。こんなときに龍角散をのむと、キキョウ・セネガの有効成分サポニン配糖体が、気管内面からの粘液の分泌を高め、線毛運動を活発にして、タンをとり去り、セキを鎮め炎症をやわらげます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 次の症状のある人

高熱

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

- (2) 5～6日服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

せき、たん、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

用法・用量


次の量を添付のサジ（1杯0.3g）で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1杯	3～6回
11歳以上15歳未満	2/3杯	
8歳以上11歳未満	1/2杯	
5歳以上8歳未満	1/3杯	
3歳以上5歳未満	1/4杯	
1歳以上3歳未満	1/5杯	
3ヶ月以上1歳未満	1/10杯	
3ヶ月未満	服用しないこと	


●龍角散は直接のどの粘膜に作用して、効果をあらわす薬です。

●必ず水なしで服用してください。


龍角散の服用方法



①中フタを開けて。



②サジに山盛りに取って。



③舌の上に薬をおき、ゆっくり溶かすようにしながらノドの方に運んで下さい。

〈用法・用量に関する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量

1.8g（大人1日量）中

成 分	含 量
キキョウ末	70mg
キョウニン末	5.0mg
セネガ末	3.0mg
カンゾウ末	50mg

添加物：炭酸Ca、リン酸水素Ca、炭酸Mg、安息香酸、香料

〈保管および取り扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限（外箱に記載）を過ぎたものは服用しないでください。

お問合わせ先

本剤について何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店または、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



株式会社 龍角散 [お客様相談室] 東京都千代田区東神田2-5-12

電話 03-3866-1326 時間 10:00～17:00（土・日・祝祭日は除く）



株式会社 龍角散

千葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3
本社所在地：東京都千代田区東神田2-5-12