

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

龍角散せき止め錠

医薬品

鎮咳去痰薬

こどもでも大人でも、せきが止まらない時は本当につらいものです。
つらいせきが続くと、睡眠もさまたげられ体力も消耗しますので、できる限り早く止めることが大切です。

龍角散せき止め錠は、たんんの排出を容易にする塩酸プロムヘキシン（去痰剤）、アレルギー性のせきに効果のあるフマル酸クレマスチン（抗ヒスタミン剤）、せき中枢を抑制してせきを鎮めるリン酸ジヒドロコデイン（鎮咳剤）などを配合して、すみやかにせきやたんを改善するお薬です。

さらにフマル酸クレマスチンには、他の抗ヒスタミン剤と比較してねむけや口のかわきなどの副作用が少ないという特徴があります。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）、鎮静薬
2. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないでください。
（眠気があらわれることがあります。）



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦または妊娠していると思われる人
 - （3）授乳中の人
 - （4）高齢者
 - （5）本人または家族がアレルギー体質の人
 - （6）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （7）次の症状のある人
高熱、排尿困難
 - （8）次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
 - （1）服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難

- （2）5～6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
便秘、口のかわき

【効能・効果】 せき、たん

【用法・用量】 次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人(15歳以上)	3 錠	3 回
11歳以上15歳未満	2 錠	
5歳以上11歳未満	1 錠	
5歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 9錠（大人の1日量）中

成 分	含 量
塩 酸 ブロムヘキシン	12 mg
フマル 酸 クレマスチン	1.34 mg
リン酸ジヒドロコデイン	30 mg
d1-塩 酸 メチルエフェドリン	75 mg
ノスカピン	60 mg
無 水 カフェイン	90 mg
カンゾウ乾燥エキス	105 mg (819 mg)
キキョウ乾燥エキス末	120 mg (600 mg)
セネガ乾燥エキス	36 mg (600 mg)

() :
原生薬換算量

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ケイ酸A θ 、乳糖、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤に付着しますと、表面のフィルム層の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないようにしてください。

お問合わせ先

株式会社龍角散【お客様相談室】
東京都千代田区東神田2-5-12
電話：03-3866-1326
時間：10:00～17:00（土・日・祝日を除く）

— メ モ —

購入店など記入して下さい。

発売元

 株式会社 龍角散

東京都千代田区東神田2-5-12

製造販売元

小林薬品工業株式会社

岐阜県岐阜市中鷺1丁目139番地