

龍角散せき止め錠

鎮咳去痰薬

こどもでも大人でも、せきが止まらない時は本当につらいものです。

つらいせきが續くと、睡眠もさまたげられ体力も消耗しますので、できる限り早く止めることが大切です。龍角散せき止め錠は、たんの排出を容易にする**ブロムヘキシン塩酸塩**（去痰剤）、アレルギー性のせきに効果のある**クレマスチンフマル酸塩**（抗ヒスタミン剤）、せき中枢を抑制してせきを鎮める**ジヒドロコデインリン酸塩**（鎮咳剤）などを配合して、すみやかにせきやたんを改善するお薬です。さらに**クレマスチンフマル酸塩**には、他の抗ヒスタミン剤と比較してねむけや口のかわきなどの副作用が少ないという特徴があります。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。】

1. 次の人は服用しないでください
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
（眠気等があらわれることがあります。）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
5. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。高熱、排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、興奮、けいれん
泌 尿 器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック （アナフィラキシー）	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】 せき、たん

【用法・用量】 次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15 歳以上）	3 錠	3 回
11歳以上15歳未満	2 錠	
5歳以上11歳未満	1 錠	
5歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】 9錠（大人の1日量）中

成 分	含 量
プロムヘキシン塩酸塩	12mg
クレマスチンフマル酸塩	1.34mg
ジヒドロコデインリン酸塩	30mg
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	75mg
ノスカピン	60mg
無水カフェイン	90mg
カンゾウ乾燥エキス	105mg (819mg)
キキョウ乾燥エキス末	120mg (600mg)
セネガ乾燥エキス	36mg (600mg)

() :
原生薬換算量

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、ケイ酸Aℓ、乳糖水和物、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色5号

【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）。
(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
(5) 水分が錠剤に付着しますと、表面のフィルム層の一部が溶けて斑点を生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手で触れないようにしてください。

問 合 せ 先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

 株式会社 龍角散 お客様相談室

東京都千代田区東神田2-5-12

電話 03-3866-1326 時間 10:00～17:00（土・日・祝日は除く）

発売元  株式会社 龍角散
東京都千代田区東神田2-5-12
製造販売元 小林薬品工業株式会社
岐阜県岐阜市中鷺1丁目139番地