

口中洗浄・うがい薬
アストリンゴゾール
のどの炎症と痛みに

Astring-o-Sol®
MOUTHWASH GARGLE

アストリンゴゾールは、うすめて使ううがい薬です。
のどや口の中に炎症や痛みがあるとき、アストリンゴゾール
でうがいをしますと、炎症や痛みがやわらぎます。
また、うがいをしたあと、口の中に爽快な感じがえられます。

アストリンゴゾールは、次のようなときに使用してください

- 風邪でのどに炎症があるとき、アストリンゴゾールでうがいをしますと、炎症や痛みがやわらぎます。
- 口の中に炎症があるとき、アストリンゴゾールでうがいをしてください。

△ 使用上の注意



相談すること

- 1.次的人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
次の症状のある人。
口内のひどいだれ
- 2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1)使用後、次の症状があらわれた場合

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----|
| 口 | 刺激感 |

(2)5~6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能】

咽喉炎、口内炎の口中洗浄

口腔、咽喉の含嗽洗浄

【用法・用量】

●口中・のどに炎症のある場合

本品の約5mL(茶さじ1杯)を約45mL(コップ1/4杯)のぬるま湯に加えて、よくかきませ、うがいするか、または口中をゆすいでください。1日3~4回行ってください。

●口中・のどの洗浄

本品の約2.5mL(茶さじ1/2杯)を約45mL(コップ1/4杯)の水に加えて、よくかきませ、うがいするか、または口中をよくゆすいでください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)うがい用にのみ使用してください。

【成 分】(100mL中)

| | |
|----------|---------|
| サリチル酸メチル | 4.615g |
| ミルラ流エキス | 0.566g |
| 塩化亜鉛 | 0.421g |
| 無水クエン酸 | 0.0015g |
| エタノール | 63.961g |

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)火気には近づけないでください。
- (5)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

【お問い合わせ先】

グラクソ・スミスクライン株式会社

コンシューマーヘルスケア事業本部 お客様相談課

電話：03-5786-6315

受付時間：10:00~15:00(土、日、祝日を除く)