

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒、口臭除去に



©/Uketo

口腔内殺菌消毒薬

イソジン®うがい薬

イソジンうがい薬は、ポビドンヨードを有効成分とするうがい薬です。

- 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- イソジンうがい薬は、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内及びのどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を示します。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。
□内のひどいだけ
- (4) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

■用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

<用法・用量に関連する注意>


- (1) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は使用する時にうすめて、早めに使用してください。
- (4) 定められた用法、用量を厳守してください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

イソジンうがい薬はこれようにご使用ください。

うがいは1日数回行ってください。1回分のうがい液は、次のように入すめてつくってください。


うすめ方

①



1～2目盛りを
入れます。

②



コップ1/3が
約60mLの
目安です。

1) キャップを開けて、うがい薬がはねないように注ぎ口をお持ちのコップに入れます。2) ボトルを逆さまにまっすぐにして目盛りを見ながら、ボトルの側面をゆっくり押し、1～2目盛りのうがい薬をコップに入れてください。(1目盛りで約2mLの薬剤がです。)

うがい薬を入れたコップに、約60mLになるように水を入れてうすめてください。一般のコップでは、1/3くらいが約60mLの目安です。

■成分・分量 1mL中 ポピドンヨード70mg (有効ヨウ素として7mg)

●添加物として、エタノール、*l*-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

■効能・効果 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■包装 30mL、50mL、120mL、180mL、250mL、500mL

<製品情報問い合わせ先>

明治製菓株式会社 <すり相談室>電話(03)3273-3474

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

<副作用被害救済制度の問い合わせ先>

(独)医薬品医療機器総合機構 電話0120-149-931(フリーダイヤル)

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

製造販売元

明治製菓株式会社

104-8002 東京都中央区京橋2-4-16

技術提携:ムンディファーマ B.V.

K-ADGJS