

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

のどの殺菌・消毒、口臭除去に 口腔内殺菌消毒薬



©Vacco

イソジン[®] うがい薬

イソジンうがい薬は、ポビドンヨードを有効成分とするうがい薬です。
口中からのどにすぐれた殺菌・消毒効果が広がります。

日本標準商品分類番号
87226

- 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- イソジンうがい薬は、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内及びのどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を示します。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。

(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(3) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

(4) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。

その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

■用法・用量

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。

(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。

なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(3) 本剤は使用する時にうすめて、早めに使用してください。

(4) 定められた用法、用量を厳守してください。


(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

イソジンうがい薬は、このようにご使用ください。


1回分のうがい液は、次のようにうすめてつくってください。

包装によりカップの形状が少し異なりますが、使い方は同じです。

うすめ方



カップには、底に対して斜めに2本の目盛りがあります。
(120mL包装のカップは、2本の目盛りの間が、すりガラス状です) 目盛りの部分が水平になるようにカップをかたむけてください。



1) ボトルのキャップを開けて、うがい薬がはねないように、注ぎ口をカップの中に入れます。
2) 側面を指でゆっくり押し、「2」の目盛り(約2mL)から「4」の目盛り(約4mL)の間までうがい薬を入れてください。



カップをもとにもどし、上部にある「60」の目盛りまで水を入れます。これで1回分のうがい液(約60mL)ができます。



1日数回、うがいしてください。

イソジン®うがい薬

- 成分・分量 1mL中 ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)
●添加物として、エタノール、*l*-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

<成分・分量に関連する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

- 効能・効果 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

■保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)衣服等に付着すると着色しますので注意してください。
なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

- 包装 50mL、120mL、180mL、250mL、500mL

発売元

株式会社 明治

136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2 - 4 - 16

技術提携:ムンディファーマ B.V.

<製品情報問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社

<すり相談室>電話 (03) 3273-3474

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)


<副作用被害救済制度の問い合わせ先>

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

120mL、180mL、250mL包装の、計量カップです。



IE7 #ADGL

ISODINE® UGAIGUSURI
Precautions

<Never Do>

(Follow the instructions or worsening of the present symptoms as well as adverse reactions may occur.)

Anyone who has had an allergic reaction to this product should not take this medication.

<Need to Consult>

1. Consult a physician or a pharmacist before using this product if:

- (1) You or your family are prone to develop allergic reactions.
- (2) You have a history of drug allergy.
- (3) You have severe erosion of buccal mucosa.
- (4) You suffer from thyroid malfunction.

2. Immediately stop using this product and consult a physician or a pharmacist, bringing this package insert, in the following cases:

- (1) In case any of the following symptoms appears after using this product.

Affected site	Symptom
Mouth	Roughness, smarting pain, burning sensation and irritation
Digestive system	Nausea
Others	Uncomfortable feeling

Rarely, the following serious symptoms may appear. In such case immediately consult a physician.

Diagnosis	Symptom
Anaphylactic shock (Anaphylactoid reaction)	Immediately after taking this product, symptoms such as pallid facial color, cold hands and feet, cold sweat or respiratory distress accompanied by urticaria, edema or chest distress may occur.

- (2) In case symptoms do not improve despite use of this product for 5 to 6 days.

■Dosage and Administration

Dilute 2 to 4 mL of this product in about 60 mL of water for one time and gargle several times a day.

<Precautions>

- (1) This product is only for gargling; do not ingest or use for cuts or burns.
- (2) Take care so that this product does not get into the eyes. Should it get into the eyes, immediately rinse them with water or lukewarm water and see an ophthalmologist if you develop a severe irritation.
- (3) Dilute this product as needed and use immediately.
- (4) Use this product exactly as indicated under "Dosage and Administration".
- (5) Children should be supervised by their guardians while using this product.

●How to use

This gargle must be diluted before use as follows. A measuring cup is included in the 120-mL, 180-mL, and 250-mL packages. Although the cups are slightly different in shape between the packages of different volumes, the usage procedure is the same. ①There are two measurement lines delineated in the cup aslant to the bottom. (The cup in the 120-mL package has ground-glass appearance between the two lines.) Lean the cup and make the lines level. ②1) Open the cap of the bottle and put the pouring spout in the cup to avoid splashing of gargle. 2) Slowly push the sides in with your fingers and pour the gargle up to a level between the lines "2" (about 2 mL) and "4" (about 4 mL). ③Place the cup back in the original position, and pour water up to the line "60" closer to the edge of the cup. Now you have a dilute solution (about 60 mL) ready for gargling at a time. ④Gargle several times a day.

■Composition

Active ingredients: povidone iodine 70 mg/mL (available iodine 7 mg/mL)

●Additives: ethanol, *l*-menthol, saccharin sodium and flavor

<Precautions>

The color of dental materials (such as dentures) containing silver may change when using this product.

■Indications

Disinfection and cleaning of the oral cavity and throat, and elimination of halitosis

■Cautions for storage and handling

- (1) Seal tightly and store in a cool place avoiding direct sunlight.
- (2) Keep out of reach of children.
- (3) To prevent improper use and loss of quality, do not transfer the product to another container.
- (4) Pay attention to coloring when it comes into contact with natural fabrics, etc. Immediately wash it off with water in this case.
- (5) Do not use the product after its validity date has expired.

■Further information available from

Meiji Seika Pharma Co., Ltd. Drug Information Center: Phone:03-3273-3474

Office hours: 9 am-5 pm (except Sat., Sun. and holidays)

Distributed by

Meiji Co., Ltd.

1-2-10 Shinsuna, Koto-ku, Tokyo, Japan

Manufactured and Distributed by

Meiji Seika Pharma Co., Ltd.

2-4-16 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Japan

Licensed by Mundipharma B.V.