

のどの殺菌・消毒、 口臭の除去に

120mL (計量カップ付)



のど

ケンエー うがい薬

ポビドンヨード製剤

のどの殺菌・消毒、 口臭の除去に

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

ケンエーうがい薬

医薬品

ケンエーうがい薬は、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

 相談すること 1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

- (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 口内のひどいただれのある人。
- (4) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

*以下右側面へ

* 使用上の注意のつづき

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〔効能効果〕

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

〔用法用量〕

1回、本剤 2～4 mL を水約 60 mL に薄めて、1 日数回うがいしてください。

〔用法用量に関連する注意〕

(1) 用法用量を厳守すること。

(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

(3) うがい用にのみ使用すること。

(4) 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用すること。

〔成分分量〕 100 mL 中

ポビドンヨード 7.0 g (有効ヨウ素 700 mg) 含有
添加物：エタノール、1-メントール、サッカリンNa、
プロピレングリコール、香料

〔成分分量に関連する注意〕

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（銀歯等）が変色することがある。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。

(2) 小児の手の届かない所に保管すること。

(3) 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

(4) 衣類等に付着したときは、すぐに洗い流すこと。

のどの殺菌・消毒、 口臭の除去に

ポビドンヨード製剤

使用法

添付の計量カップを斜めにして本剤を 2～4 目盛のところまで入れ、水を 60 の目盛まで加えて攪拌してからうがいしてください。



製造発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626



製造番号

使用期限