

この添付文書は、使用前によくお読みください。
また、使用が終わるまで大切に保管してください。

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

第3類医薬品

コフチール うがい薬

コフチールうがい薬は、さまざまな細菌・真菌・ウイルスなどの微生物に対して殺菌作用をもった「ポビドンヨード」を有効成分とする製剤で、のどの殺菌・消毒・洗浄ならびに口臭を除去することができるうがい薬です。

【特徴】

- ・コフチールうがい薬は、口腔内のさまざまな細菌に対し強い殺菌作用があります。
- ・コフチールうがい薬によるうがいは、口腔内の細菌を洗浄し、細菌に侵された患部を消毒します。
- ・コフチールうがい薬は、口臭や口内の不快感をとり去ります。
- ・コフチールうがい薬は、口内の粘膜を刺激せず、使用後はさわやかです。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。
口内のひどいただれ
- (3) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚（ふ）	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
うがい液をはきだせない年齢の小児には使用させないでください。
- (3) うがい用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、うすめた液は、早めに使用してください。
- (5) 使用法

うがいの仕方

キャップをあけて容器をさかさに持ち、指でゆっくり押して本剤2～4mL（添付の計量コップを斜めにして、2～4目盛）を取り、約60mL（計量コップを水平にもどし60目盛）の水でうすめて、ていねいにうがいしてください。



【成分・分量】

1mL中 ポビドンヨード …………… 70mg

（有効ヨウ素7mg含有）

添加物として、ヨウ化K、l-メントール、D-ソルビトール液、サッカリンナトリウム水和物、グリセリン、アルコールを含有します。

＜成分・分量に関連する注意＞

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 薬液が衣類に付着した時は、すぐに水または洗剤で洗ってください。落ちにくい場合にはチオ硫酸ナトリウム（ハイポ）で洗ってください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 添付の目盛り付きコップはご使用のつど、水洗いなどして常に清潔に保管してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824

TEL：0748-52-2323

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元

福地製薬株式会社

滋賀県蒲生郡日野町寺尻824