

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

第3類医薬品

ネオヨジン®うがいぐすり

ネオヨジンうがいぐすりは、口中やのどの有害な細菌に対し短時間で殺菌効果を発揮します。
口腔内の殺菌・消毒や洗浄に適しており、また、口臭除去作用も有しています。

- 特 徴
- ☆広範囲の細菌に殺菌効果を有します。
 - ☆短時間で殺菌効果をあらわします。
 - ☆メントールやペパーミントの香りが口臭や口内の不快感を除き、また、のどを爽やかにします。
 - ☆口内の粘膜を刺激しません。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 本人又は家族がアレルギー体質の人
 - 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - 次の症状のある人
 - 口内のひどいただれ
 - 甲状腺の疾患のある人
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
 - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	悪心
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。

- 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

効能・効果

- 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄
- 口臭の除去

用法・用量


1回2～4 mLを約60 mLの水でうすめて1日数回うがいしてください。

〈使用法〉うがいの仕方

50mL 入りの場合

キャップをはずして容器を逆さに持ち、指でゆっくりと押します。本剤2～4 mL（1～2 目盛り）をコップにとり約60mL（コップ約 1/3）の水でうすめ、ていねいにうがいしてください。

130mL、300mL 入りの場合



① 1回2～4mLを添付コップの線まで入れて

② コップを傾け液が2～4 mL 入ったことを確認し


③ 水（水道水）でうすめてコップ約60mLの量にし

④ 口中が充分うがいできるようにていねいに

添付のコップをかたむけて 1 回 2～4 mL をコップの底部に刻んだ斜めの目盛り線まで入れて約60 mL（目盛り線まで）の水でうすめ、ていねいにうがいしてください。

〔計量〕

〔希釈〕



〈用法・用量に関連する注意〉

- 1 定められた用法・用量を守ってください。
- 2 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、うがい液をはき出せない年齢の小児には使用させないでください。
- 3 本剤はうがいのみで使用し、内服用としては使用しないでください。
- 4 本剤はうがいする時にうすめてください。（うすめた液は保存しないでください。）

成分・分量

成 分	1 mL 中 日局ポビドンヨード 70mg 含有
添加物	炭酸水素 Na、クエン酸、ヨウ化 K、サッカリン Na、エタノール、ℓ-メントール、香料
性 状	赤褐色の液体で、芳香があり味は甘い

〈成分及び分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 衣類等に付着すると着色しますのでご注意ください。付着した場合はすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、開封後は使用期限内であっても速やかに使用してください。



包

装

50mL、130mL、300mL

◎本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

岩城製薬株式会社 電話 (03) 3241-3201 受付時間 平日 9 00～17 00

製造販売



岩城製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町4-8-2

C80709