

A  
B  
C  
D  
1  
2  
3  
4

うがい薬 Gargle

ポビドンうがい薬

効能又は効果  
口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法及び用量

1日、本剤2~4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがいでください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬液を入れます。コップを水平にもどし、上部の水平の線まで水を入ると、約60mLになります。

〈用法及び用量に関連する注意〉

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)うがい用のみ使用してください。(3)本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用してください。

成分及び分量 1mL中

ポビドンヨード 70mg(有効ヨウ素7mg)  
添加物:サッカリンナトリウム水和物、トメントール、ユーカリ油、無水エタノール、濃グリセリン、マクロゴール400、ヨウ化カリウム、香料

〈成分及び分量に関連する注意〉

本品の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

保存及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(4)薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。(5)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。(使用期限は箱背面・ボトル底面に記載)

環境にやさしいパッケージです。R70  
薬液を飲む際は必ずお飲みください。

第3類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。

△使用上の注意事項

⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないこと  
本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

⊗相対すること

- 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(2)次の症状のある人。口内のひびいたれ。  
(3)次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。
- 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この薬箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください



HapYcom ハビコム 第3類医薬品

みんなの声で、よくなるね。

うがい薬  
のどの殺菌・消毒  
口臭除去に

用法・用量 1日数回、1回2~4mLを  
約60mLの水にうすめてうがい


封開年月日

開封時に記入してください。

HapYcom 第3類医薬品


うがい薬

のどの殺菌・消毒  
口臭除去に  
使いやすい計量コップ付き



液体の色 黒褐色 内容量 120mL

〈うがいのしかた〉



1度目のうがい(口臭除去)  
うがい液を口を含み、口全体にいきわたるようにクチュクチュとうがいます。

2度目のうがい(殺菌・消毒)  
のどの奥まで、うがい液が届くように上を向いてガラガラとうがいます。

使用期限  
製造番号

玉川南村株式会社 お客様相談窓口  
TEL.03-3861-2037  
受付時間 9:00~17:00(土・日・夜を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931

製造販売元  
タマガワ  
玉川南村株式会社  
東京都千代田区若本町2-2-16

CD-CG-TM

ボトル: PE  
キャップ: PP  
紙箱

毎日毎日  
毎日毎日  
毎日毎日  
毎日毎日


HapYcom ハピコム 第3類医薬品

# うがい薬

のどの殺菌・消毒  
口臭除去に

300mL

使いやすい計量コップ付き



1. 計量コップをかたむけて、本品を2と4の線の間まで入れます。
2. コップを水平に戻し、60の線まで水を入れます。



「ポビドンうがい薬」

第3類医薬品

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
**使用上の注意事項** **【してはいけないこと】**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 **【相応すること】**  
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 次の症状のある人。口内のひどいただれ。(3) 次の診断を受けた人。甲状腺機能障害。  
 2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5〜6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください **【効能又は効果】** □腔内及びのどの殺菌・消毒、洗浄、口臭の除去 **【用法及び用量】** 1回、本剤2〜4mLを、約60mLの水でうすめて、1日数回うがってください。計量コップをかたむけ、目盛りにあわせて薬剤を入れます。コップを水平にもとし、上部の水平の線まで水を入れると、約60mLになります。

**用法及び用量に関する注意** (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) うがい用のみ使用してください。(3) 本品は使用するときのみ希釈し、うすめた液は早めに使用してください。 **【成分及び分量】** 1mL中ポビドンヨード…70mg(有効ヨウ素7mg) 添加物 サッカリンナトリウム水和物、トメントール、ユーカリ油、無水エタノール、濃グリセリン、マフロゴール400、ヨウ化カリウム、香料 **成分及び分量に関する注意** 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(銀歯等)が変色することがあります。保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 薬液が衣類や洗面台等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください。(5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。(使用期限はボトル底面に記載)

製造販売元  
**タマガワ** CD-CC-K  
 玉川衛材株式会社  
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-2-16  
 玉川衛材株式会社 お客様相談窓口  
 TEL.03-3861-2037  
 受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝を除く)  
 副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



4