

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

|      |               |
|------|---------------|
| 貯 法  | 直射日光を避けて、室温保存 |
| 使用期限 | 容器に最終年月表示     |


うがい薬  
ポリヨードン・ガーグル  
POLYIODINE GARGLE

- 【特徴】 (1) ポリヨードン・ガーグルは、細菌やウイルスに対して殺菌的作用を持っている「ポビドンヨード」を含むうがい薬です。  
(2) ポリヨードン・ガーグルの消毒効果により、口の中にできた傷口などから、細菌が侵入するのを防ぎ、また細菌に侵された口の中の患部を消毒します。  
(3) 口の中の粘膜や傷口に対する刺激が少ないので組織を傷つけずに、患部が消毒できます。  
(4) 皮膚や衣類に付いたものは、水で容易に洗い落とせます。

ポリヨードン・ガーグルうがい薬はこのように使用してください。

うがいは1日数回行ってください。1回分のうがい液は次のようにうすめてください。

そなえつけのコップをかたむけ、刻んだ目盛りにあわせて、2～4mL薬剤を入れます。コップを水平にもどし、上部に刻んである水平の線まで水を入れると、約60mLになります。



△【使用上の注意】

してはいけないこと



- (1) 本剤又はヨウ素に対し、過敏症の既往歴のある人は使用しないでください。  
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
- (2) キズややけどには使用しないでください。
- (3) 本剤はうがいのみで内服しないでください。

相談すること



- (1) 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。
  1. 甲状腺の疾患のある人
  2. 口の中のただれのひどい人
- ※(2) まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。  
ショック(アナフィラキシー)：使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれます。
- (3) 数日間使用しても症状が改善されない場合、直ちに使用を中止し、医師、歯科医師又は薬剤師に相談してください。

その他の注意

- (1) 本剤は使用する時にうすめ、うすめた液は早めに使用してください。
- (2) 使用期限は3年ですが、使用期限内であっても、開封後は速やかに使用してください。
- (3) 眼に入らないように注意してください。入った場合には、直ちに水又はぬるま湯で十分に洗ってください。
- (4) 小児に使用する場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5) 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

【効能・効果】 口腔内及びのどの殺菌、消毒、洗浄、口臭の除去

【用法・用量】 用時15～30倍(本剤2～4mLを約60mLの水)にうすめて、1日数回うがいしてください。

【性 状】 本剤は赤褐色の液で僅かに特異なおいがあり、酸性を呈します。

【成 分】 本剤は1mL中ポビドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)を含有し、添加物として香料を含有します。

【取扱い上の注意】

- (1) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (2) 直射日光をさけ、涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 100mL、250mL、500mL※※

【梱 包】 100mL×20本入、250mL×20本入、500mL×10本入※※

【消費者相談窓口】 兼一薬品工業株式会社 医薬情報室 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号  
TEL 06(6471)3548 FAX 06(6471)5659

【製造販売元】 兼一薬品工業株式会社 〒555-0033 大阪市西淀川区姫島3丁目5番23号