

咽喉塗布剤

日本薬局方

複方ヨードグリセリン

Compound Iodine
Glycerin

50mL

医薬品



製造発売元

健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

電話番号 06(6231)5626

ご使用に際して、外箱の説明文を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

日本薬局方 複方ヨード・グリセリン



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は
薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 口内又はのどのひどいただれのある人。
- (7) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- (8) 患部が広範囲の人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱
を持って医師又は薬剤師に相談すること

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	悪心
その他	不快感

* 以下右側面へ

*** 使用上の注意のつづき**

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー 様症状	胸苦しき、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる。

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

【効能効果】 のどの殺菌・消毒

【用法用量】 適宜、適量を患部に塗布する。

〈用法用量に関連する注意〉

- (1) 用法用量を厳守すること。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 塗布用にのみ使用すること。
- (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること。

【成分分量】 100 mL中

ヨウ素 1.2 g、液状フェノール 0.5 mL、グリセリン 90 mL含有

添加物：ヨウ化カリウム、ハッカ水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



製造番号

使用期限