

Compound Iodine Glycerin

日本標準商品分類番号8727

□腔用殺菌消毒剤

第2類医薬品

日本薬局方

複方ヨードグリセリン

「タイセイ」P

(ルゴール液)



500mL

製造販売元

大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
0942-53-4662(代表)

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 妊婦、妊娠していると思われる婦人、または授乳中の婦人
- (2) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (3) 本剤またはヨウ素に対して過敏症の既往歴のある人
- (4) 患部が広範囲の人、口内またはのどのただれがひどい人
- (5) 甲状腺の疾患のある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師または薬剤師に相談すること。

- (1) 使用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがあるので、その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	胸苦しさ、むくみ、じんましん、発疹等があらわれる

- (2) 5～6日間使用しても症状の改善が見られない場合

【効能・効果】
のどの殺菌・消毒

【用法・用量】
適宜、適量を患部に塗布する
〈用法用量に関連する注意〉

- (1) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。
- (2) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤ってのみ込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること。
- (3) 小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用すること。
- (4) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (5) 外用にのみ使用すること。

【成分・分量】
本品100mL中：ヨウ素1.2g、ヨウ化カリウム2.4g、ハッカ水4.5mL、液状フェノール0.5mL、グリセリン90mLを含有する。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい場所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れかえないこと。（誤用の原因になったり、品質が変わる。）

【性状】

本品は赤かった色粘稠性の液で特異なおいがある。

使用期限

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いいたします。
大成薬品工業株式会社 D I 室
電話：0942-53-4662(代表)

本 体：ガラス 外栓：PP
中栓：PE



4 987297 204761

製造番号