

□ 腔用殺菌消毒剤

第2類医薬品

日本薬局方

複方ヨードグリセリン

「タイセイ」P

(ルゴール液)



500mL

製造発売元

大成薬品工業株式会社  
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1

使用に際して、この説明文を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください  
本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 口内又はのどのひどいいたれのある人。
- (6) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。
- (7) 患部が広範囲の人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状             |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 口    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称       | 症状   |
|-------------|--|
| アナフィラキシー様症状 | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる。 |

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

のどの殺菌・消毒

【用法・用量】

適宜、適量を患部に塗布する。

【用法用量に関連する注意】

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) のどに塗るとき、綿等に薬液をしみこませ過ぎないように注意すること。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。

使用期限

製造番号

- (4) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (5) 塗布用のにのみ使用すること。
- (6) 薬液や薬液をしみこませた綿等を誤って飲み込んだ時は、直ちに医師の診療を受けること。

【成分・分量】

本品100mL中 ヨウ素1.2g、液状フェノール0.5mL、グリセリン90mL、添加物としてヨウ化カリウム、ハッカ水含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かないところに保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、あるいは下記にお願いいたします。  
大成薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：0942-53-4662(代表)  
9:00～17:00(土日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

🔄 外栓: PP  
中栓: PE  
本体: ガラス



4 987297 204761