

服用前に、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

第2類医薬品

〈漢方製剤〉

満量処方

かっ こん とう
イトーの葛根湯エキス顆粒

- ・かぜのひきはじめに。(体がゾクゾクし、寒気が取れないような状態)
- ・頭痛、肩こりなどの症状に。

！ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が
起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4) 胃腸の弱い人。
- (5) 発汗傾向の著しい人。
- (6) 高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8) 次の症状のある人。
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

**2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者
に相談してください**

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばり に加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振 等があらわれる。

**3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合は5~6回)
服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください**

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

裏面につづきます






効能

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

※食間とは？…食後2～3時間後のことです。

1日3回 食前又は食間	1回量				
	成人 (15才～)	7才～14才	4才～6才	2才～3才	2才未満
	1包	2/3包	1/2包	1/3包	1/4包
					

1. 定められた用法・用量を厳守してください。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分

※満量処方とは？…漢方処方より得られたエキスを全量配合していることを意味します。

1日量(1.5g×3包)中 葛根湯エキス2.55g

カッコン 4.0g ケイヒ 2.0g ショウキョウ 1.0g

マオウ 3.0g シャクヤク 2.0g

タイソウ 3.0g カンゾウ 2.0g

上記生薬より抽出

添加物としてセルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、カルメロースCa、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
(湿気などにより薬が固化することがあります。)
5. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



妊娠中



生後3カ月
～1才未満



生後3カ月
未満

×：服用しない

△：医師、薬剤師または登録販売者に相談

※その他ご注意は、本書(表面)をご覧ください。

お客様相談室

☎06-6743-3033 10:00～17:00(土日祝を除く)

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931