

使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管しておいてください。

荒れたのどに直接シュッ！

ジェントルスロートAZ

のどを使いすぎたり、汚れた空気や乾燥した空気が原因となつてのどが炎症を起こすと、のどにいたみを感じたり、いがらっぽいか乾燥感を生じたりします。ジェントルスロートAZはカミツレという薬草の成分から水溶性に誘導された「アズレンスルホン酸ナトリウム」を主成分とし、優れた消炎効果を発揮します。患部に直接作用して炎症を鎮め、のどをさわやかに保ちます。また、口内炎などの口内の炎症による諸症状にも効果があります。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 次の症状がある人。
口内のひどいただれ
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

〔用法・用量〕

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- 口を開けて、口元に容器を近づけ、ノズルをのどの患部にむけて、軽く息をはきながら2～3回噴射してください。(息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、声を出しながら噴射してください。)
- 目に入らないよう注意してください。(噴射の際には軽く目を閉じてください。)万一目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量〕 1g中

成分	分量
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.2mg

添加物としてグリセリン、プロピレングリコール、*l*-メントール、pH調節剤、香料を含有する。

〔保管および取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に、キャップをかぶせて保管してください。
 - (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
 - (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因となったり、品質が変わることがあります。)
 - (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 初めてお使いになるときは、キャップをはずし液が出るまで数回頭部を押してください。
 - 携帯する場合は、液もれを防ぐために必ずキャップをしっかりはめてください。
 - 低温では液が出にくくなることがあります。常温で使用してください。
 - 使用後にノズルの部分に液が付着したときは、清潔なティッシュペーパー等でふいてからキャップをかぶせてください。
 - 本製品の淡青色は、アズレンスルホン酸ナトリウムに由来するもので、着色剤は使用しておりません。
 - ノズルの穴を針等で突かないでください。

〔包装〕

25mL ノンガス・タイプ

本品についてのお問い合わせは下記にお願い申し上げます。

池田薬品工業株式会社 お客様相談室

電話 (076)-472-3311(大代表)

受付時間 平日 8:10~17:00