

販売名:ケンラク内服液

使用上の注意 【相談すること】

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位:消化器 症状:吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること／軟便、下痢 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果 ● 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労・脚氣「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師または薬剤師に相談すること。」● 次の場合のビタミンB1の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

用法・用量

大人(15歳以上)1回1本(50mL)を1日2回服用する。●用法及び用量を厳守すること。

成分・分量 1日量[100mL(50mL×2)]中

ベンフォチアミン（ビタミンB1誘導体）60mg、リボフラビン（ビタミンB2）4mg、ピリドキシン塩酸塩（ビタミンB6）40mg、ニコチン酸アミド60mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム400mg

添加物としてクエン酸、DL-リンゴ酸、白糖、D-ソルビトール、安息香酸、エデト酸カルシウム二ナトリウム、香料、アルコール、プロピレンギリコール、バニリン、エチルバニリンを含有します。

●本剤に配合されているリボフラビンにより、尿が黄色になることがあります。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限の過ぎた製品は服用しないこと。

お問い合わせ先

ティイクファルマケア株式会社

電話 0879-25-7771

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

発売元

ティイクファルマケア株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

金陽製薬株式会社

奈良県五條市佐川町1420番地

副作用被害救済制度

0120(149)931

使用期限

Lot No.



ガラス:ビン 金属:キャップ

HapYcom

第3類医薬品

肩

ケンラク 内服液

眼精疲労・腰痛  
肉体疲労時 50mL

こり